


S-HLR BARN


Hjärt-lungräddning för sjukvårdspersonal

BARN 0-1 ÅR


Medvetslös?



Skapa öppen luftväg
Andas?




Ingen eller onormal andning
Ge 5 inblåsningar



Inga eller osäkra livstecken
Gör HLR 15:2


Djup: 4 cm, takt: 100-120/min




Samordna bröstkompressioner och inblåsningar

BARN 1 ÅR TILL PUBERTET


Medvetslös?



Skapa öppen luftväg
Andas?



Ingen eller onormal andning
Ge 5 inblåsningar



Inga eller osäkra livstecken
Gör HLR 15:2

Djup: 5 cm, takt: 100-120/min



Samordna bröstkompressioner och inblåsningar

Larma larmgrupp

Primärvård, tandvård:

Larma 112

Hämta akututrustning

BARN

När barn drabbas av hjärtstopp beror det oftast på att de inte kunnat andas. Ge därför barnet 5 inblåsningar direkt och starta hjärt-lungräddning.

HLR MED GOD KVALITET:

Hjälp varandra att kontrollera att inblåsningar ger synlig bröstkorgshöjning och att bröstkompressionerna utförs på rätt sätt. Minimera alla avbrott i HLR.

ARBETSORDNING VID HJÄRTSTOPP HOS BARN:

Personal 1 - Påbörjar Barn-HLR och tillkallar hjälp

Personal 2 - Larmar och hämtar akututrustning

Personal 3 - Utför HLR tillsammans med personal 1

Om hjärtstartare finns - anslut och följ råd

VUXNA

När vuxna drabbas av plötsligt hjärtstopp beror det oftast på livshotande rytmrubbningar. Starta HLR 30:2. Hämta hjärtstartare, anslut och följ råd."

